

Верно
Подлинник находится
на ФКП "Армавирская биофабрика"
Секторискусств

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вирусвакцины «ВГНКИ»
сухой культуральной против болезни Ауески
(организация-разработчик: ФКП "Армавирская биофабрика", Краснодарский край)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Вирусвакцина «ВГНКИ» сухая культуральная против болезни Ауески.

Международное непатентованное наименование: Вирусвакцина «ВГНКИ» сухая культуральная против болезни Ауески.

2. Лекарственная форма - лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций, живая вакцина. Вакцина изготовлена из аттенуированного вируса болезни Ауески (штамм «ГНКИ»), полученного на культуре клеток фибробластов куриных эмбрионов, с добавлением желатино-сахарозной среды (50%) в качестве стабилизатора.

По внешнему виду вакцина представляет собой сухую аморфную массу желтоватого или слегка розоватого цвета.

Вакцину выпускают по 2 см³ во флаконах вместимостью 10 см³, содержащих 12, 25, 50, 125 доз или по 4 см³ во флаконах вместимостью 10 см³ содержащих, 25, 50, 125, 250 доз, герметично укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной упаковывают в картонные коробки. В каждую коробку вкладывается инструкция по применению препарата. Коробки с вакциной упаковывают в ящики.

Срок годности вакцины 18 месяцев, с даты выпуска, при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечению срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2⁰С до 10⁰С или при постоянной температуре ниже 0⁰С.

5. Вакцину следует хранить в местах недоступных для детей.

6. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, а также остатки вакцины, не использованные в течение 4 часов после вскрытия флакона подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут, с обязательным оформлением акта утилизации.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

II. Биологические свойства

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у свиней, овец и крупного рогатого скота через 10-15 суток после ревакцинации, продолжительностью 15-16 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе вакцины содержится не менее 400 ЛКД_{50/см³} вируса болезни Ауески (штамм «ГНКИ»).

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. Порядок применения

8. Вакцина предназначена для профилактики болезни Ауески у свиней, овец и крупного рогатого скота в неблагополучных и угрожаемых по данной болезни хозяйствах.

9. Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных.

10. Перед применением вакцину разводят стерильным изотоническим раствором из расчета 2 см³ на одну прививную дозу. Во вскрытый, с соблюдением правил асептики флакон с помощью шприца с иглой вносят 2-3 см³ изотонического раствора и тщательно перемешивают до образования однородной взвеси (2-3 минуты). Разведенную вакцину переносят в стерильный флакон, куда добавляют изотонический раствор до требуемого объема. Вакцину перед применением необходимо взбалтывать и предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Вакцину вводят подкожно или внутримышечно с соблюдением правил асептики и антисептики, согласно приведенным схемам.

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ И ОБЪЕМ ВИРУСВАКЦИНЫ В УГРОЖАЕМЫХ ПО БОЛЕЗНИ АУЕСКИ ХОЗЯЙСТВАХ

Группа животных	Возраст	Объем вакцины в см ³		
		1-я вакцинация	2-вакцинация через 20-25 дней	3 вакцинация (ревакцинация)
Поросята-сосуны	16-30 дн.	1,0	2,0	2,0 (через 2 мес.)
Поросята-отъемыши и свиньи старших возрастов	С 20 дн. возраста и старше	2,0	2,0	2,0 (через 11-12 мес.)
Телята	6-12 мес.	0,5	1,0	
КРС старших возрастов	12 и более мес.	0,5	2,0	
Ягнята	6-12 мес.	0,5	1,0	
Взрослые овцы		0,5	2,0	

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ И ОБЪЕМ ВИРУСВАКЦИНЫ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО БОЛЕЗНИ АУЕСКИ ХОЗЯЙСТВАХ

Группа животных	Возраст	Объем вакцины в см ³		
		1-я вакцинация	2-вакцинация через 20-25 дней	3 вакцинация (ревакцинация)
Поросята-сосуны	2-15 дн.	0,5	1,0	2,0 (через 2 мес.)
Поросята-сосуны	16-30 дн.	1,0	2,0	2,0 (через 2 мес.)
Поросята-отъемыши и свиньи старших возрастов	С 20 дн. возраста и старше	2,0	2,0	2,0 (через 11-12 мес.)
Телята	6-12 мес.	0,5	1,0	
КРС старших возрастов	12 и более мес.	0,5	2,0	
Ягнята	6-12 мес.	0,5	1,0	
Взрослые овцы		0,5	2,0	

В хозяйстве, где выявлено заболевание болезнью Ауески крупного рогатого скота, вакцинируют только крупный рогатый скот.

При выявлении в хозяйстве болезни Ауески овец, вакцинируют только овец.

Телят и ягнят в возрасте до 6 месяцев, в неблагополучных хозяйствах, не вакцинируют.

Поросятам до 20-ти дневного возраста вакцину вводят подкожно, старше — внутримышечно.

11. Симптомов проявления болезни Ауески или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. Особенности поствакцинальных реакций при первичной или повторной иммунизации не установлено.

13. Следует избегать нарушения сроков проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики болезни Ауески.

14. У отдельных вакцинированных поросят-сосунов и отъемышей в течение 2-3 суток может быть повышение температуры тела на 1-1,5⁰С.

15. Запрещается применение вакцины против болезни Ауески совместно с другими живыми иммунобиологическими препаратами.

В период обработки животных вакциной не допускается дегельминтизация в течение 7 дней до и 13-14 дней после вакцинации.

16. Мясо, молоко и другую продукцию, полученную от здоровых вакцинированных животных реализуют без ограничения независимо от сроков вакцинации.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами